

Среди онкологических заболеваний у мужчин рак простаты занимает 2-ое место, уступая лишь раку легкого. Последние годы увеличивается распространенность рака предстательной железы. Симптоматика рака предстательной железы на ранних стадиях, которые могут длиться достаточно долго, неотличимы от доброкачественной гиперплазии предстательной железы и даже хронического простатита. На ранних стадиях рак предстательной железы хорошо поддается лечению и излечению. Рак предстательной железы отличается медленным и злокачественным течением.

Это означает, что опухоль растет медленно (по сравнению с раком желудка, легкого, кожи и т.п.), она может не проявляться многие годы. С другой стороны рак простаты дает ранние метастазы, то есть опухоль небольших размеров уже может распространяться на другие органы. Чаще всего распространение заболевания идет в кости (таз, позвоночник, ребра, легкие, печень, головной мозг). До появления метастазов опухоль можно удалить и это остановит заболевание.

Современная диагностика рака предстательной железы — весьма простой и быстрый алгоритм. Каждый мужчина старше 50 лет 1 раз в год должен сдавать анализ крови на PSA (простатический специфический антиген), который является маркером рака предстательной железы.

Сдать кровь на анализ можно в поликлинике МУЗ «Омская ЦРБ» (г.Омск, ул.Малиновского, 14) и во всех участковых больницах и амбулаториях Омского района. Информация по телефону 77-54-49.